bioanalytica
Medizinisches Labor
Mitglied des Medisupport Netzwerkes
Bioanalytica AG
St. Annastrasse 36
Postfach 6858
6000 Luzern 6
Tel. +41 41 375 71 71
Fax +41 41 375 71 70
bio.service@bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch

01. 02. 03. 04. 05. 06.

Mikrobiologie Gynäkologie

Bitte vollständig in Blockschrift ausfüllen!

Name: _____ Vorname: _____

Geburtsdatum: _____ EDV-Nr.: _____

Bei Kind, Name der erziehungsberechtigten Person: _____

Patienten-Etikett

Str.: _____

PLZ: _____ Wohnort: _____

☐ männlich ☐ weiblich

☐ Dringend ☐ Vertraulich
☐ Telefon ☐ Fax
☐ Handy ☐ E-Mail
☐ Nr. / Adr.: .....

☐ Befundkommentar erwünscht

Dr med
Max Muster
Bahnhofstrasse 777
3172 Niederwangen
Tel: +41 31 777 77 77

Befund-Kopie:
☐ Patient
☐ Arzt / andere (Name, Vorname, Ort): .....

1-080110-4030

Entnahmedatum: _____
Zeit: _____

KVG-Typ:
☐ Schwangerschaft
☐ Krankheit
☐ Unfall

Rechnung automatisch an Krankenkasse
Vers.-Nr.: _____
Name KK: .....

Wenn anders gewünscht bitte ankreuzen:
☐ Auftraggeber ☐ zwingend Patient ☐ Andere: .....

Klinische Angaben / Fragestellung:

☐ SS ja Woche + Tage

30.10.2018, 11:05:35 MAMU 2002001

GENITALTRAKT

☐ Vaginalabstrich
☐ Vaginal- / Analabstrich
☐ Cervixabstrich
☐ Vulvaabstrich
☐ Urethralabstrich
☐ Ano-rektal-Abstrich
☐ Ulkus- / Bläschenabstrich Lokalisation: _____
☐ Penisabstrich
☐ Ejakulat 8
☐ Urin nach Prostatamassage (Urin-Vacutainer) 8
☐ Vorher gelöster Mittelstrahlurin (Urin-Vacutainer) 8
☐ Douglaspunktat
☐ Fruchtwasser / Plazenta
☐ Andere:

Allgemeine Bakteriologie	
Multiplex-PCR Urogenitaltrakt 2	
Chlamydia trach. / Neisseria gono. PCR	
Genitale Ulcera Multiplex PCR 6	
Streptokokken Gr.B in der Schwangerschaft	
Allgemeine Bakt. inkl. Anaerobier	
Aktinomyzeten Kultur	
Chlamydia trachomatis PCR	
Gardnerella vaginalis Kultur	
Hefen	
Hämophilus ducreyi PCR	
Listerien Kultur	
Mycoplasma hominis / Ureaplasmen Kultur	
Mycoplasma genitalium / M. hominis / Ureaplasma parvum / U. urealyticum PCR	
Mycoplasma genitalium PCR	
Neisseria gonorrhoeae PCR	
Neisseria gonorrhoeae Kultur	
Treponema pallidum PCR	
Toxoplasma gondii PCR	
VIREN: Cytomegalovirus PCR, qualitativ	
VIREN: Herpes-simplex-Virus 1 + 2 PCR	
VIREN: HPV inkl. Typisierung PCR	
VIREN: Parvovirus B19 PCR	

Klinische Angaben:

Antibiotika vor Entnahme:

Antibiotika nach Entnahme:

2 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, U. parvum, T. vaginalis
6 HSV-1, HSV-2, T. pallidum, H. ducreyi, Lymphogranuloma venereum (C. trachomatis Serotypen L1-L3), CMV, VZV
8 Bei Prostatitisabklärung einen Mittelstrahlurin (Vac.) vor- und einen 2. Urin (oder Ejakulat) nach Prostatamassage einzuschicken

DERMATOMYKOSEN

☐ Hautschuppen
☐ Nagel
☐ Haare
☐ Andere:

Lokalisation: _____

Dermatophyten, Schimmelpilze und Hefen	
Nur Direktpräparat, Mikroskopie	

Klinische Angaben:

☐ richtig ☒ falsch

HARNWEGE

		Mittelstrahlurin (Urin-Vacutainer)	Dauerkatheterurin (Urin-Vacutainer)	Einmalkatheterurin (Urin-Vacutainer)	Blasenpunktionsurin (Urin-Vacutainer)	Morgendlicher Erststrahlurin (nativ)	Früher Nachmittagsurin (nativ) (zwischen 11:00 - 15:00)	Mittelstrahlurin (nativ)	Mittelstrahlurin (Eintauchnährboden)	Dauerkatheter (Eintauchnährboden)	Einmalkatheter (Eintauchnährboden)	Andere:
Allgemeine Bakteriologie	1	☐	☐	☐					☐	☐	☐	☐
Multiplex-PCR Urogenitaltrakt	2					☐						☐
Chlamydia trach. / Neisseria gono. PCR						☐						☐
Mycoplasma hominis / Ureaplasmen Kultur					☐	☐						☐
Mycoplasma genitalium / M. hominis / Ureaplasma parvum / U. urealyticum PCR					☐	☐						☐
Hefen		☐	☐	☐	☐							☐
Allgemeine Bakteriologie inkl. Anaerobier					☐							☐
Chlamydia trachomatis PCR						☐						☐
Legionella pneumophila Antigen		☐				☐		☐				☐
Streptococcus pneumoniae Antigen		☐				☐		☐				☐
Neisseria gonorrhoeae PCR						☐						☐
Neisseria gonorrhoeae Kultur						☐						☐
M. tuberculosis-Komplex Kultur (mind. 100 ml) ☐1 ☐2 ☐3						☐						☐
Microsporidien PCR						☐						☐
Schistosomen (mind. 100 ml, Expressversand)							☐					☐
VIREN Adenovirus PCR	3					☐						☐
VIREN Cytomegalovirus PCR, qualitativ						☐		☐				☐
VIREN Enterovirus PCR	3					☐						☐

Klinische Angaben:

Krankheitsdauer:

Immunsuppression:

Antibiotika vor Entnahme:

Antibiotika nach Entnahme:

1 Von klinisch relevanten Erregern wird automatisch ein Antibiogramm erstellt
2 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis
3 Nicht im akkreditierten Bereich

MULTIRESISTENTE BAKTERIEN, TRÄGERTUM

	Nasen- / Rachenabstrich, beidseits	Leistenabstrich, beidseits	Axillärer Abstrich, beidseits	Ano-rektal-Abstrich	Stuhl nativ (Deckel weiss)	Stuhl in Cary Blair (Deckel braun)	Mittelstrahlurin (nativ)	Mittelstrahlurin (Urin-Vacutainer)	Andere:
MRSA Kultur und Resistenz	☐	☐	☐					☐	☐
MRSA PCR	☐	☐	☐				☐		☐
ESBL, Kultur und Resistenz				☐	☐	☐		☐	☐
Multiresistente gramnegative Erreger (MRGN)				☐	☐	☐		☐	☐
VRE, Kultur und Resistenz				☐	☐	☐			☐

Klinische Angaben:

Für internen Gebrauch, bitte leer lassen!

Ausgepackt: _____ Interne Bemerkungen: _____

Etikettiert: _____ _____

☐ richtig ☒ falsch